



Acerbine-Lösung

Wirkstoffe: DL-Äpfelsäure, Salicylsäure, Benzoessäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist *Acerbine Lösung* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Acerbine Lösung* beachten?
3. Wie ist *Acerbine Lösung* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Acerbine Lösung* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist *Acerbine Lösung* und wofür wird es angewendet?

Dieses Arzneimittel ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Wirkungsweise

Acerbine Lösung wirkt desinfizierend, schmerzlindernd und beschleunigt die Wundheilung. Sie begünstigt die Ablösung von abgestorbenem Gewebe von der Wundoberfläche und fördert gleichzeitig die Bildung von neuem, gesundem Gewebe. Durch die spezielle Zusammensetzung wirkt *Acerbine Lösung* antiseptisch, das Wassergleichgewicht im Wundbereich und der Heilungsprozess werden in vielfältiger Weise begünstigt.

Anwendungsgebiete

Acerbine Lösung eignet sich zur Behandlung von oberflächlichen Hautverletzungen, wie zum Beispiel Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand, Wunden, Abschürfungen.

Acerbine Lösung wird angewendet bei Erwachsenen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Acerbine Lösung* beachten?

***Acerbine Lösung* darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Äpfelsäure, Salicylsäure, Benzoessäure oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie *Acerbine Lösung* anwenden.

- Wenn Sie großflächige Wunden und Verbrennungen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Falls Sie ein Geschwür haben, an einem Dekubitalgeschwür (Geschwüre durch Druckeinwirkung, bei Bettlägerigkeit) leiden oder auf eine Haut-Transplantation vorbereitet werden, müssen Sie einen Arzt konsultieren.
- Bei Störung der Nierenfunktion darf *Acerbine Lösung* nicht großflächig und länger angewendet werden.

Acerbine Lösung darf nicht mit den Schleimhäuten, insbesondere im Bereich der Augen und dem Mund in Kontakt kommen; waschen Sie sich nach der Anwendung die Hände.

Bei Fortbestand der Beschwerden, unklaren Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Kinder (und Jugendliche)

Die Anwendung von *Acerbine Lösung* bei Neugeborenen wird nicht empfohlen.

Anwendung von *Acerbine Lösung* mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Wechselwirkungen wurden bisher nicht beobachtet.

Salicylsäure kann jedoch die Aufnahme anderer, an gleicher Stelle aufgetragener Arzneimittel verstärken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Anwendung von *Acerbine Lösung* in der Schwangerschaft und Stillzeit ist prinzipiell möglich.

In der Schwangerschaft und Stillperiode darf *Acerbine Lösung* nur kleinflächig angewendet werden.

Während der Stillzeit darf *Acerbine Lösung* im Brustbereich nicht aufgetragen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Acerbine Lösung hat keinen oder einen zu vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Acerbine Lösung enthält Benzoessäure, Salicylsäure und Propylenglycol

Einzelne Inhaltsstoffe (Benzoessäure, Salicylsäure, Propylenglycol) können Hautreizungen hervorrufen. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird *Acerbine Lösung* gut vertragen.

3. Wie ist *Acerbine Lösung* anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Acerbine Lösung auf die Wunde aufsprühen oder mit steriler, mit *Acerbine Lösung* getränkter Kompresse bedecken.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Anwendung bei Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen:

Acerbine Lösung 2mal täglich oder öfter auf die Wunde aufsprühen oder frisch befeuchten.

Nach Einsetzen der Vernarbung genügt meist eine Anwendung pro Tag.

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Fortschritt des Wundheilungsprozesses.

Bei länger dauernder Anwendung sollten Sie die Behandlung von einem Arzt überprüfen lassen.

Wenn Sie eine größere Menge von *Acerbine Lösung* angewendet haben, als Sie sollten

Bisher wurden keine Fälle von Überdosierung mit *Acerbine Lösung* berichtet.

Wenn bei großflächiger Anwendung zu große Mengen *Acerbine Lösung* über einen längeren Zeitraum aufgetragen werden, kann es, besonders bei Kindern, durch Aufnahme von Salicylsäure in den Organismus zu milden Vergiftungserscheinungen kommen. Anzeichen sind Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerz, Ohrgeräusche, Schweißausbrüche und Verwirrtheit. Durch Dosierungsverringerung werden diese Symptome vermieden.

Salicylsäure in höherer Dosierung kann Mikroblutungen verursachen und die Blutungszeit verlängern.

Wenn Sie die Anwendung von *Acerbine Lösung* vergessen haben

Tragen Sie weiter die gewohnte Menge der Spezialität auf, ohne die Dosis zu erhöhen.

Wenn Sie die Anwendung von *Acerbine Lösung* abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann *Acerbine Lösung* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen können in folgenden Häufigkeiten auftreten:

- *Sehr häufig* ($\geq 1/10$)
- *Häufig* ($\geq 1/100$, $< 1/10$)
- *Gelegentlich* ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$)
- *Selten* ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$)
- *Sehr selten* ($< 1/10.000$)
- *Nicht bekannt* (*Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*).

Es können folgende Nebenwirkungen auftreten:

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten kann es zu einer vorher nicht bekannten allergischen Überempfindlichkeitsreaktion (Kontaktsensibilisierung) gegenüber Salicylsäure kommen.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Häufig kann *Acerbine Lösung* nach dem Auftragen zu einem vorübergehenden leichten Hitze- oder Schmerzgefühl führen, anschließend empfindet der Patient eine rasche, anhaltende Schmerzlinderung.

Selten treten unmittelbar um den behandelten Wundbereich leichte Hautrötung und Hautausschlag des gesunden Gewebes auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5, AT-1200 WIEN, Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist *Acerbine Lösung* aufzubewahren?

Nicht über 30°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nach dem ersten Öffnen nicht länger als 12 Monate verwenden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. dem Behältnis nach <verwendbar bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was *Acerbine Lösung* enthält:

- Die Wirkstoffe sind: DL-Äpfelsäure, Benzoessäure und Salicylsäure.
1 g enthält 21,5 mg DL-Äpfelsäure, 1,5 mg Benzoessäure und 0,4 mg Salicylsäure.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglycol, gereinigtes Wasser.

Wie *Acerbine Lösung* aussieht und Inhalt der Packung

Klare, gelbliche Lösung in Sprüh-Flasche zu 30 ml und 80 ml Inhalt im Faltpack.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT Ges.m.b.H.
6067 Absam, Österreich, Tel.:+43 0 5223 57926 0,
Fax:+43 0 5223 57926 11, E-mail: pharma@montavit.com

Z.Nr. 15.124

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2014.

