

Gel-Sectan[®]

Anwendungsbereich

Gel-Sectan ist für die Anwendung zur Wiederherstellung der Darmfunktion bei Patienten mit veränderter Funktion aufgrund von Reizdarmsyndrom (RDS), Überempfindlichkeit des Darms oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente bestimmt, um Symptome wie chronischen oder wiederkehrenden Durchfall, abdominales Spannungsgefühl, Schmerzen, Blähbauch und Flatulenz zu lindern und zu vermeiden.

Packung

Blisterpackung mit dreißig Kapseln zur Anwendung bei Erwachsenen.

Zusammensetzung

Xyloglucan, Erbsenprotein und Traubenkernextrakt, Xylooligosaccharide, Magnesiumstearat (pflanzlich) und amorphe gefällte Kieselsäure.

Anwendungshinweis

Kapsel mit Flüssigkeit schlucken.

Dosierung

Abhängig vom Schweregrad der Symptome 1 oder 2 Kapseln zweimal täglich (morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Abendessen) im Zeitraum von 2 bis 4 Wochen. Die Behandlung kann falls nötig aufrechterhalten werden.

Warnhinweise

- » Es ist nicht notwendig vor der Anwendung des Medizinproduktes eine medizinische Fachkraft zu konsultieren. Dennoch ist dies bei schweren oder anhaltenden Symptomen empfehlenswert oder wenn Unsicherheiten bezüglich der Diagnose bestehen, hauptsächlich bei älteren Menschen.
- » Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich nicht um eine pharmakologische Behandlung. Falls eine solche Behandlung von einem Arzt empfohlen wird, kann das Medizinprodukt begleitend verabreicht werden.
- » Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, wird empfohlen, falls nicht anderes vom Arzt verordnet, das Medizinprodukt nicht während der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten der Stillzeit anzuwenden.
- » Das Medizinprodukt nicht nach Ablauf des Verfalldatums anwenden, das auf der Packung abgedruckt ist.
- » Das Produkt nicht anwenden, wenn die Blisterpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- » Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
- » Das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen

Gel-Sectan soll nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan oder einen der im Abschnitt „Zusammensetzung“ genannten sonstigen Bestandteile des Produkts angewendet werden.

Rev.04: 02.05.2017



NOVENTURE, S.L.
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona, Spanien

Vertrieb

Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstraße 96
6067 Absam (Österreich)
106395-1



1310023

CE
0476